Bollettino fitosanitario n. 4 del 18/04/2019 - Area Alta Val d'Agri

A cura del Servizio di Difesa Integrata dell'ALSIA, per l'applicazione della Difesa Integrata, ai sensi del D.Lgs. 150/2012, per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Si precisa che per la difesa integrata obbligatoria è possibile utilizzare tutte le sostanze attive registrate per ciascuna avversità delle colture considerate.
Le sostanze attive consigliate nel bollettino sono tra quelle indicate nei disciplinari di produzione integrata della Regione Basilicata.

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Bosco Galdo

MELO:
bottoni rosa-fioritura del fiore centrale

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): la coltura è nella fase di massima recettività alla malattia. Le ultime infezioni si sono avute in seguito alle piogge del 13-14 e 15 aprile. Ancora alto rischio per possibili infezioni in seguito alle piogge previste per il pomeriggio di lunedì 22 aprile. Con vegetazione non protetta, intervenire in caso di pioggia, preventivamente o entro 24 ore dalla pioggia infettante, con metiram, dithianon, dithianon + pyrimetanil o zolfo, fluxapyroxad, penthiopyrad (questi ultimi due in miscela con prodotti a diverso meccanismo di azione), fluopyram + tebuconazolo, fluazinam, pyrimetanil, ciprodinil, fosfonato di potassio (in miscela a prodotti di copertura o entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante con difenoconazolo).

Carpocapsa *(Cydia pomonella):* installare le trappole a feromoni. Alla fine della prossima settimana è possibile che inizi il primo volo dell'anno.

PERO: *piena fioritura*

TRATTAMENTI IN FIORITURA DELLE COLTURE

Durante il periodo della fioritura delle colture è

VIETATO eseguire trattamenti insetticidi, acaricidi o con altri presidi sanitari che risultino tossici per le api. Per fioritura si intende il periodo che va dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. (art.15.L.R. n° 35/88)
Prima degli interventi, in presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento.

VITE : *gemma cotonosa*

Mal dell'esca (*Phaeomoniella clamidospora, Phaeoacremonium oleoliphilum, Fomitiporia punctata*) :
potare separatamente le piante affette da questa malattia e già segnalate in estate, eliminando completamente il legno infetto; i ceppi totalmente compromessi devono essere eliminati. E' necessario disinfettare le superfici di taglio e gli attrezzi con ipoclorito all'1%: il materiale di potatura infetto non deve essere trinciato, ma allontanato dal vigneto.

AASD Bosco Galdo, via Grumentina 136 85050 Villa d'Agri (Pz) tel: 0835 244 606
e-mail: camilla.nigro@alsia.it

Bollettino fitosanitario n. 4 del 18/04/2019 - Area Alta Val d'Agri

A cura del Servizio di Difesa Integrata dell'ALSIA, per l'applicazione della Difesa Integrata, ai sensi del D.Lgs. 150/2012, per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Si precisa che per la difesa integrata obbligatoria è possibile utilizzare tutte le sostanze attive registrate per ciascuna avversità delle colture considerate.
Le sostanze attive consigliate nel bollettino sono tra quelle indicate nei disciplinari di produzione integrata della Regione Basilicata.



OLIVO : *riposo vegetativo*

Occhio di pavone *(Spilocaea oleaginea)*: nei campi con presenza di varietà suscettibili alla malattia o situati in zone umide in cui la malattia si è presentata nell'annata scorsa, è necessario intervenire con prodotti a base di *rame* o *dodina.* Si ricorda che, dopo il trattamento con rame, si può manifestare un'azione defogliante a carico della sola vegetazione infetta che risulta eradicante la malattia.
La varietà Leccino è resistente alla malattia.
Le infezioni che avvengono in tarda primavera, si manifestano dopo 2-3 mesi. E' però possibile rendere evidente subito la presenza della malattia attraverso la diagnosi precoce che consiste nell'immergere le foglie per 1-2 minuti in una soluzione di soda caustica al 5% riscaldata ad una temperatura di 50°C.

Rogna (*Pseudomonas siringae* pv. *savastanoi):*
Il trattamenti con prodotti a base di rame sono efficaci anche contro questa batteriosi (oltre che contro la cercospora) per evitarne in questa fase la diffusione.
Con le operazioni di potatura è necessario poi favorire l'arieggiamento e l'insolazione delle parti interne della chioma ed eliminare e distruggere i rami colpiti .
La varietà Frantoio è molto sensibile alla malattia.

Fleotribo (*Plhoeotribus scarabeoides*): per prevenire l'insediamento dell'insetto, è utile distribuire in più punti dell'oliveto dei rami di potatura per utilizzarli come "rami-esca", che dovranno poi essere bruciati.

Xylella fastidiosa: in caso di ingiallimenti e disseccamenti sospetti, segnalarli al servizio fitosanitario

Villa D'Agri-Alsia

Situazione attuale | Ultime 72 ore | Stagionale | Previsioni meteo

Giornaliero | giovedì 18 | venerdì 19 | sabato 20 | domenica 21 | lunedì 22 | martedì 23 | mercoledì 24

	Tempo	Precipitazioni		Temp.		Um. Rel.	
		Prob. %	mm	Min °C	Max °C	%	Descrizione
giovedì 18		10	0	0,9	16,3	67	moderato
venerdì 19		10	0	1,1	16,7	69	moderato
sabato 20		10	0	2,4	18	66	moderato
domenica 21		27	0	4,4	13,9	66	moderato
lunedì 22		65	2,5	6,2	20,4	76	moderato
martedì 23		10	0	8,7	21,7	68	moderato
mercoledì 24		10	0	8,3	22,9	72	moderato