

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 6 DEL 14/9/2017

AREA POLLINO E LAGONEGRESE

A cura del Servizio di Difesa Integrata e dell'AASD "Pollino" dell'ALSIA per l'applicazione della Difesa Integrata, ai sensi del D.Lgs. 150/2012.

OLIVO: *drupe in accrescimento*

Mosca dell' olivo (*Bactrocera oleae*)


Controllare le trappole a feromone per monitorare la presenza del parassita, fino ad ora sono state rilevate basse percentuali di punture fertili.



POMODORO IN PIENO CAMPO: *Raccolta*

Tignola del pomodoro (*Tuta Absoluta*)

E' buona norma distruggere i residui della coltivazioni dell' anno precedente, ed installare le trappole a feromone per monitorare la presenza del parassita. Si consiglia di intervenire alle prime catture quando si rilevano le gallerie sulle foglie alternando i principi attivi registrati sulla coltura : **Bacillus thuringiensis varietà kurstaki**, **Azadiractina** (solo in fertirrigazione), **Indoxacarb**, **Spinosad**, **Emamectina**, **Metaflumizone**, **Etofenprox** e **Clorantranilprole** per evitare fenomeni di resistenza.



PEPERONE: *Raccolta*

Virosi Come prevenzione per le virosi trasmesse per contatto, è necessario ricavare il seme da piante esenti da virus o sottoporlo in seguito a disinfezione mediante trattamenti chimici o fisici.

Tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*)

Si rimanda a quanto detto per il pomodoro

N.B. I prodotti fitosanitari, le soglie di intervento e le limitazioni da osservare sono riportate integralmente nei "Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Basilicata 2017".

E' bene ricordare che i trattamenti fitosanitari vanno effettuati preferibilmente di sera, in assenza di vento, con attrezzature a bassa pressione rispettando intervalli e norme di sicurezza!

Per informazioni contattare

Il tecnico dr.ssa Marcella Illiano, Lagonegrese (3283355800)

p.a. Vincenzo Lauria, Pollino (3338284570)

POMODORO IN PIENO CAMPO: *Raccolta*

Vincolo sull' uso dei fungicidi

Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità.

Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, Fosetil Al e tutti i prodotti biologici.

Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; ammesso un impiego di diverse formulazioni con la stessa sostanza attiva solo per lo smaltimento di scorte o problemi nell'approvvigionamento; in quest'ultimo caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità massima di sostanza attiva prevista da una delle formulazioni utilizzate

MELANZANA ROSSA: *raccolta*

Negli impianti ove vi siano stati attacchi di **Tracheoverticilloso** si consiglia di distruggere le piante infette e programmare ampie rotazioni colturali.

FAGIOLO : *Raccolta*

Ruggine (*Uromyces appendicolatus*)

In condizioni di elevata umidità e temperature comprese tra i 20 ed i 24 gradi, effettuare trattamenti cautelativi con **prodotti rameici**. In presenza dei primi sintomi è possibile usare prodotti a base di **Azoxystrobin** per non più di 2 volte all'anno.

Per la prevenzione del **virus del mosaico comune del fagiolo BCMV**, trasmesso anche per seme, è necessario ricavare seme da piante virus-esenti o pensare di utilizzare varietà resistenti.